ADDIS

Id: Vux recert 2 MD 8019 (M)
**Datum:** 2019-01-08, **Intervjuare**: Börje Dahl
**A = Aktuell, L = Livstid, A1 = En gång under senaste året**

Diagnosen beroende kräver minst 3 aktuella symptom utspridda i 3 av de 6 beroendekriterierna.

| Fråga nr. | Alkohol | Sömn-/lugnande | Opioider | Cannabinoider | Centralstimulantia | Ecstasy | Kokain | Hallucinogener | Lösningsmedel | Annat | Blandat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **1. En stark önskan/känsla av tvång att ta drogen** |
| 41 | | | | | | | | | | | | 41 | Tankemässig koncentration |
| 42 | | | | | | | | | | | | 42 | Säkrar tillgängligheten |
| 43 | | | | | A | | | | | | | 43 | Tvångsmässig använd |
| | | | | | | | | | | | | | **2. Svårt att kontrollera användning: Mängden, Tidpunkten eller att sluta** |
| 34 | A | | | | A | | L | | | | | 34 | Använt mer än tänkt/föreskrivits |
| 35 | A | | | | A | | L | | | | | 35 | Längre än avsetts |
| 44 | | | | | A | | L | | | | | 44 | Misslyckat försök att kontrollera |
| 45 | | | | | A | | L | | | | | 45 | Oförmåga att minska/sluta |
| | | | | | | | | | | | | | **3. Abstinensbesvär** |
| 74 | | | | | | | | | | | | 74 | Abstinensbesvär |
| 75 | | | | | | | | | | | | 75 | Skakningar |
| 76 | | | | | | | | | | | | 76 | Användning för att lindra/undvika abstinensbesvär |
| 77 | | | | | | | | | | | | 77 | Hallucinationer/allvarlig förvirring |
| | | | | | | | | | | | | | **4. Tolerans** |
| 21 | | | | | | | | | | | | 21 | Ökad mängd |
| 24 | | | | | | | | | | | | 24 | Hög alkoholkonsumtion |
| 37 | A | | | | A | | | | | | | 37 | Ökad tolerans |
| | | | | | | | | | | | | | **5. Offrar andra nöjen och intressen p g a användning/använd tid att komma åt drogen/hämta sig** |
| 17 | | | | | | | | | | | | 17 | Frekvent drickande |
| 26 | | | | | A | | | | | | | 26 | Frekvent användning |
| 36 | | | | | | | L | | | | | 36 | Alkohol/drogperioder |
| 46 | | | | | A | | | | | | | 46 | Minskat/slutat med aktiviteter/intressen |
| 47 | | | | | | | | | | | | 47 | Försummat planerade aktiviteter |
| 48 | | | | | A | | | | | | | 48 | Frånvaro från skola/jobb |
| 49 | | | | | | | | | | | | 49 | Försummat arbete |
| 50 | | | | | A | | | | | | | 50 | Användning/återhämtning större delen av dagen |
| 51 | | | | | A | | | | | | | 51 | Drogcentrerat liv |
| 73 | | | | | | | | | | | | 73 | Mindre tid för familjen |
| | | | | | | | | | | | | | **6. Fortsatt medveten användning trots uppenbara negativa konsekvenser** |
| 40 | | | | | | | | | | | | 40 | Minnesluckor/blackouts |
| 52 | | | | | | | | | | | | 52 | Minnes-/koncentrationsproblem |
| 53 | | | | | | | | | | | | 53 | Känslomässiga problem |
| 71 | | | | | | | | | | | | 71 | Relaterade hälsoproblem |
| 72 | | | | | | | | | | | | 72 | Bruk trots vetskap om fys/psyk problem |
| | **3/2** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **11/4** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | | |