

Diagnosen beroende kräver minst 3 aktuella symptom utspridda i 3 av de 6 beroendekriterierna.

Fråga nr.	Alkohol	Sömn-/lugnande	Opioider	Cannabinoider	Centralstimulantia	Ecstasy	Kokain	Hallucinogener	Lösningsmedel	Annat	Blandat		
41		A	A	L								41	Tankemässig koncentration
42			A	L								42	Säkrar tillgängligheten
43		L	A									43	Tvångsmässig använd
													<b>1. En stark önskan/känsla av tvång att ta drogen</b>
34	A	L	A	L								34	Använt mer än tänkt/föreskrivits
35	A	L	A	L								35	Längre än avsetts
44		L	A									44	Misslyckat försök att kontrollera
45		L	A									45	Oförmåga att minska/sluta
													<b>2. Svårt att kontrollera användning: Mängden, Tidpunkten eller att sluta</b>
74			A									74	Abstinensbesvär
75												75	Skakningar
76												76	Användning för att lindra/undvika abstinensbesvär
77												77	Hallucinationer/allvarlig förvirring
													<b>3. Abstinensbesvär</b>
21												21	Ökad mängd
24												24	Hög alkoholkonsumtion
37		A	A									37	Ökad tolerans
													<b>4. Tolerans</b>
17												17	Frekvent drickande
26			A									26	Frekvent användning
36												36	Alkohol/drogperioder
46												46	Minskat/Slutat med aktiviteter/intressen
47												47	Försummat planerade aktiviteter
48			A									48	Frånvaro från skola/jobb
49		L	A									49	Försummat arbete
50												50	Användning/återhämtning större delen av dagen
51		L	A									51	Drogcenterat liv
73		L	L									73	Mindre tid för familjen
													<b>5. Offrar andra nöjen och intressen p g a användning/använd tid att komma åt drogen/hämta sig</b>
40												40	Minnesluckor/blackouts
52		L										52	Minnes-/koncentrationsproblem
53			A	L								53	Känslomässiga problem
71			A									71	Relaterade hälsoproblem
72												72	Bruk trots vetskap om fys/psyk problem
	2/1	2/2	15/6	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0		
													<b>6. Fortsatt medveten användning trots uppenbara negativa konsekvenser</b>